

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

DLP 19-7-68 816212

PUBLICATION PERIODIQUE

EDITION DE LA STATION DU LANGUEDOC

(Tél. 92.28.72)

(AUDE, GARD, HERAULT, LOZERE, PYRENEES-ORIENTALES)

Régisseur de recettes, Direction Départementale de l'Agriculture, 16, rue de la République - MONTPELLIER

C.C.P. : MONTPELLIER 5.238-57

Abonnement Annuel

25 Francs

N° 94 - Juillet 1968/24

2 ème supplément

GRELE

Les orages accompagnés de chute de grêle détruisent non seulement les récoltes de l'année mais aussi provoquent des lésions parfois très graves au système ligneux des arbres fruitiers et de la vigne. Il est toujours nécessaire de procéder à un traitement de désinfection des plaies qui facilitera la cicatrisation des tissus blessés. Utiliser un anticryptogamique de synthèse ou une bouillie cuprique neutre (sauf pour le pêcher).

MOUCHE DES FRUITS

Les captures continuent, (rares) à MONTPELLIER et des attaques sur fruits sont observées dans l'Hérault et le Gard.

Actuellement la menace se précise donc mais la situation ne présente nulle part un caractère de gravité.

Nous recommandons d'assurer la protection des derniers abricots et de continuer les traitements sur les pêches et les poires arrivant à maturité en Août (particulièrement les William's). Il ne semble pas encore utile de protéger les pommes.

TORDEUSE ORIENTALE

Des larves d'âges divers sont observées sur des abricots et des pêches.

Nous constatons un développement de l'importance de ce parasite qui doit désormais retenir l'attention de tous les arboriculteurs.

Sur les fruits devant être récoltés avant la fin Août, commencer les traitements de protection.

MILDIOU DE LA POMME DE TERRE

En altitude, renouveler la protection des cultures destinées à produire des tubercules de garde.

LL. TROUILLON

CULTURES MARAICHERES DE PLEIN CHAMP

Tomates de conserve

La persistance du temps orageux avec averses peut déclencher ou aggraver les attaques d'Alternaria. Nous recommandons donc aux producteurs de tomates de conserve de protéger leurs cultures en utilisant un des fongicides suivants : Manèbe, Mancozèbe, Folcid, Zinèbe, Zirame.

Malgré la tendance orageuse actuelle les risques de Mildiou sont actuellement nuls dans tous les secteurs de culture de tomate de conserve. Toutefois, dans certains d'entre eux des risques pourraient apparaître si les précipitations persistaient. Nous informerons alors les producteurs de la nécessité de traiter si la situation s'aggravait.

Poireaux

La Teigne du poireau rend nécessaire l'exécution des traitements.

Le Contrôleur

P. CHRESTIAN,

POMMIER

Une attaque de "zeuzère" s'est produite à nouveau dans le Bas Languedoc à partir du 11 Juillet. Une nouvelle intervention est donc nécessaire dans les vergers où les dégâts sont observés.

Dans le cas où le traitement préconisé dans notre dernier bulletin n'a pu être effectué nous rappelons que le Mévinphos est efficace 20 à 25 jours après le début de l'attaque.

Le vol de Sésie est encore important. Effectuer une pulvérisation soignée dans les 8 jours.

POIRIER

Poursuivre les traitements zeuzère et psylles dans les vergers envahis.

L'Inspecteur de la Protection des Végétaux,

P. BERVILLE